Place de la PTE inversée dans
la prise en charge des coiffes
“irréparables“ dans l'épaule
douloureuse et impotente ou
Rotator Cuff Tear Arthropathy

D.Nerisson

Rotator Cuff Tear Arthropathy

Epaules impotentes et douloureuses

PTE inversée

PTE inv et RCTA

- **1. Etude de la population cible: Rotator Cuff Tear Arthropathy (RCTA)**
- **2. Différence entre PTE inversées et anatomiques: données classiques**
- **3. PTE inversées: progrès récents et indications nouvelles**

PTE inv et RCTA

- **1. Etude de la population cible: Rotator Cuff Tear Arthropathy (RCTA)**
- 2. Différence entre PTE inversées et anatomiques
- 3. PTE inversées: progrès récents et indications nouvelles

Rotator Cuff Tear Arthropathy

Définition

Hamada et Fukuda 1990

Pathologies articulaires gléno-humérales
secondaires à une rupture de coiffe chronique,
considérée comme **irréparable**

Rotator Cuff Tear Arthropathy

Clinique

D. Nerisson

Douleur
impotence fonctionnelle majeure

Perte d'autonomie de vie

Coiffes

- réparables / irréparables -

Coiffes

- réparables -

- avantageux/ abstention si possible
- plainte douloureuse
- couplée à la RF
- tx de guérison clinique 70 à 95%
(taille, IDG muscle)

de + en + de coiffes réparables

Coiffes

- réparables -

- reprises faisables mais tx échec + élevés

Coiffes irréparables

Coiffes irréparables

- *potentiel évolutif* -

de la rupture massive de coiffe ... à l'arthrose GH excentrée

Cuff Tear Arthropathy → **6 stades de Hamada**

Cuff Tear Arthropathy

- Evolution anatomo-radiologique -

Hamada 1

Arthropathie GH

EAH > 7 mm

Hamada 2

Arthropathie GH

EAH < 7 mm

Hamada 3

Arthrose AH

“acétabulisation“

Cuff Tear Arthropathy

- Evolution anatomo-radiologique -

Hamada 4a

Arthrose GH
EAH encore présent

Hamada 4b

Arthrose GH
Acétabulisation

Hamada 5

Arthrose GH
Necrose TH

Cuff Tear Arthropathy

- Evolution anatomo-radiologique -

Hamada & Fukuda

1990

Cuff Tear Arthropathy

- *Evolution anatomo-radiologique* -

appui acromial

appui polaire sup

Hamada 4b

D. Nerisson

Cuff Tear Arthropathy

- *traduction clinique* -

4 groupes cliniques, physiopathologiques
P. Boileau JSES 2007 - 2018

Déficit ou non **RE**

Implications thérapeutiques

Cuff Tear Arthropathy

- 4 groupes cliniques et PP -

Gr 1

perte douloureuse de l'EA active

conservation balance sagittale et horizontale

Épaule douloureuse et faible

ou "PLAE"

Painful Loss of Active Elevation

Ex clin: défaillance SS et IS

Source: G Walch

RE1 contrée: IS partiel

Cuff Tear Arthropathy

- 4 groupes cliniques et PP -

Gr 2

perte isolée et complète de l'EA active

perte définitive balance sagittale
épaule pseudo paralytique
ou "ILAE"

Isolated Loss of Active Elevation

Ex clin: défaillance
SS et IS $\pm$ SSC

Source: G Walch

RE1 contrée: IS partiel

Cuff Tear Arthropathy

- 4 groupes cliniques et PP -

Gr 3

perte isolée et complète de la RE active

perte définitive balance horizontale

Epaule "ILER"

Isolated Loss of External Rotation

Ex clin: différencier défaillance IS et Tm

D. Nerisson

Cuff Tear Arthropathy

lag sign: **IS total**

Gr 3

perte isolée et
complète de la
RE active

RE2 contrée: **Tm**

clairon: défaut **IS + Tm**

Cuff Tear A

- 4 groupes -

Gr 3

perte isolée et
complète de la RE
active
“ILER“

Cuff Tear Arthropathy

- 4 groupes cliniques et PP -

Gr 4

perte combinée et complète de la RE et EA actives

perte définitive balances sagittale et horizontale

Epaule "CLEER"

Combinated Loss of Elevation and External Rotation

Ex clin: combinaison

Cuff Tear Arthropathy

- *Epaules "ILER" / "CLEER" -*

Gr 3 et 4 La perte complète de la RE1 et RE2

TRES INVALIDANT pour gestes vie quotidienne

- 1. se coiffer
- 2. se raser/maquiller
- 3. s'habiller (vêtements haut)
- 4. se servir à boire
- 5. boire (verre à la bouche)
- 6. boire soupe à la cuiller
- 7. donner la main
- 8. utiliser un téléphone à l'oreille
- 9. écrire lettre
- 10. signer lettre

Cuff Tear Arthropathy

- *Epaules "ILER" et "CLEER"* -

Gr 3 et 4

10 activités quotidiennes de base sollicitant la RE

SCORE "ADLER"

Activities of **D**aily **L**iving requiring active
External **R**otation

notes de 0 à 3 pts / items / total sur 30 pts

Cuff Tear Arthropathy

- Epaule "ILER et "CLEER" -

Perte totale de la balance horizontale par:

- disparition activité RE: IS (1) et Tm (2)
- maintient activité RI: GPe (3) - LD (4) - TM (5) ± SSC (6)

Normal

Pertes des RE

Transfert LD + TM

Cuff Tear Arthropathy

- *Epaules "ILER et "CLEER" IRM t2* -

Cuff Tear Arthropathy

- Epaules "ILER et "CLEER" IRM t2 -

Cuff Tear Arthropathy

- *Epaules "ILER et "CLEER" IRM t2* -

Cuff Tear Arthropathy

- *Synthèse et traitement* -

Après échec du traitement médical **bien conduit**:

Rééducation

- < 10 séances
- protocole précis
 - placement scapulaire
 - recentrage TH
 - coaptation GH dynamique
 - proprioception
- **40 à 75% succès sur perte EAA**
- **Ø sur perte RE**
- (*Collin & Lädermann SOO 2014, niv III*)

Quelles solutions chirurgicales?

Cuff Tear Arthropathy

- *Synthèse et traitement* -

Quelles solutions chirurgicales?

Dépendent du Stades Hamada de la CTA

St 1 et 2 : $\emptyset$ arthrose
4 groupes de Boileau

St $\geq$ 3 : omarthrose
excentrée

CTA - *Synthèse et traitement* -

Si absence d'arthrose GH ou appui acromial = **Hamada 1 ou 2**

Gr 1

> 70ans

Ténotomie LBi
+ débridement
+ “AP palliative”

> 60ans

Réparation
partielle IS ± SSC

< 60ans...

LD Transfert
polaire sup
(s/s arthroscopie)

CTA - *Synthèse et traitement* -

Si absence d'arthrose GH ou appui acromial = **Hamada 1 ou 2**

Gr 2 perte isolée et complète de l'EA active "ILAE"

*Ascension dynamique
de la TH inévitable*

PTE inversée

CTA - *Synthèse et traitement* -

Si absence d'arthrose GH ou appui acromial = **Hamada 1 ou 2**

Gr 3 perte isolée et complète de la RE active "ILER"

*IS détruit et Tm
amyotrophique*

LD $\pm$ TM transfert
latéral (open chir)

CTA - *Synthèse et traitement* -

Si absence d'arthrose GH ou appui acromial = **Hamada 1 ou 2**

Gr 4 perte combinée et complète de la RE et EA actives

IS détruit et Tm amyotrophique

PTE inversée
+ TLD

PTE inversée
+ rep IS

Cuff Tear Arthropathy

- *Synthèse et traitement* -

Si absence d'arthrose GH ou appui acromial
 = **Stades Hamada 1 ou 2**

Impact Clinique des RCR massives sans arthrose (Cuff Tear Arthropathy Hamada 1 et 2)	Balance musculaire	TTT chirurgical possible
Gr 1: perte douloureuse de l'EA active	Balance verticale et horizontales conservées (épaule faible et/ou douloureuse)	Biceps ténotomie + ou - réparation partielle de coiffe (IS ± SSC) Transfert LD ± TM (Lepiscopo)
Gr 2: perte isolée de l'EA active ou épaule pseudo paralytique	Perte définitive de la balance verticale	PTE inversée
Gr 3: perte isolée de RE active	Perte définitive de la balance horizontale	Transfert LD ± TM (Lepiscopo)
Gr 4: perte combinée EA et RE actives	Perte définitive de la balance verticale et horizontale	PTE inversée + Transfert LD ± TM (Lepiscopo)

CTA - *Synthèse et traitement* -

Si arthrose GH ou appui acromial = **Hamada ≥ 3**

*Appui acromial permanent
et arthrose GH*

*PTE inversée
 $\pm$ TLD*

Cuff Tear Arthropathy

- *Synthèse* -

St 1 et 2 : $\emptyset$ Arthrose

4 groupes de Boileau

Fonction correcte
PLAE - ILER

TTT conservateur

- Arthroscopie
- TLD sans PTE

St ≥ 3 : **omarthrose**
excentrée

altérations fonctionnelles majeures
ILAE - CLEER

PTE inv $\pm$ TLD

PTE inv et RCTA

- 1. Etude de la population cible: Rotator Cuff Tear Arthropathy (RCTA)
- **2. Différences entre PTE inversées et anatomiques: données classiques**
- 3. PTE inversées: progrès récents et indications nouvelles

PTE

- anatomique -

(Neer 1950 - 1980)

(Boileau & Walch - 1995)

OMARTHROSE centrée
avec coiffe fonctionnelle

PTE anatomique: *indications* -

OMARTHROSE centrée avec
coiffe fonctionnelle

- Primitive +++
- ONATH ++
- Sequelles de fractures TH +
- PR —

Quand la proposer?

- dès pincement GH: **évolution très rapide !!!**
- limité par:
 - l'état osseux glénoïdien
 - la dégradation possible de la coiffe

PTE

- anatomique: *resultats* -

- **Suites de + en + faciles:** voies mini invasives / protocoles de rééducation de type “coiffe arthro” (*Lafosse JSES 2009*)
- **Durée de vie longue** (*4000 PTE Mayo Clinic 2018*) surtout si réellement anatomique (*modularité 1995-2000 - Boileau & Walch*)
- **Complications:** (*Bohsali-Rockwood 2006*)
 - descellt glène (35% à > 10ans), mais 3% reprises
 - instabilité (5%)
- **Reprises réalisables (progrès des PTE inv)**
- Théoriquement possibles de 25 - 75 ans, mais souvent conditions non requises si > 60 ans (*dégradation de coiffe*)

“Fenêtre” chirurgicale courte

PTE

- inversée -

(Grammont 1987)

(Boileau & Walch - 1995)

Epaule non fonctionnelle
Coiffe irréparable
Avec ou sans omarthrose

PTE inversée

- *indications* -

- **RCTA**: Epaule non fonctionnelle
Coiffe irréparable
Avec ou sans omarthrose
- Toutes les situations compliquées / désespérées
(*fractures, reprises...*)

PTE inversée

- *biomécanique* -

- Centre rotation TH médialisé
- Allongement deltoïde (1-2,5 cm)

Valorisation du deltoïde qui remplace la coiffe dans l'EA... mais pas ou peu dans la RE!

PTE anatomique

- rappel *biomécanique* -

- Centre rotation TH latéralisé

Peu de **valorisation**
du deltoïde...

... compensée par le
contre appui du SS

PTE inversée

- *inconvenients* -

→ F de cisaillement....
descellement glénosphère

→ Médialisation du CR
⊙ la rotation active
*Sous tension ant et post
deltoïde*

PTE inversée

- complications -

1. Infections

2. Instabilité

3. Pb humérus

4. Pb glène

- ① Infections: 2% primo PTE** (*p. acnes* 70%, *s. epidermitis* 20%)
- ep douloureuses sans réaction inflammatoire bio
 - culture 15j - anaérobie - prélèvements bact sans valeurs
 - *p.acnes* dans 56% des biopsies per OP ! (Sethi JSES 2015)

PTE inversée

- complications -

2 Instabilité: 3% (n=363, Walch 2006)

défaut tension deltoïde
souvent luxation médiale

PTE inversée

- complications -

③ Humérus: 3% (n=363, Walch 2006)

Fausses route 1,5%

Fractures (0,5%)

Descellements (<1%)

PTE inversée

- complications -

④ Glène: 2% ($n=363$, Walch 2006)

Descellements - fractures (1,5%)

PTE inversée

- complications -

4 Glène: 2% (n=363, Walch 2006)

Encoches: 68%

- pré descellt
- Ø douleurs
- Force

(Levigne 2006, n=451)

PTE inv et RCTA

- 1. Etude de la population cible: Rotator Cuff Tear Arthropathy (RCTA)
- 2. Différence entre PTE inversées et anatomiques
- **3. PTE inversées: progrès récents et indications nouvelles**

PTE inversée

- progrès - limites -

Progrès

1. Techniques chirurgicales
2. Implants humérus - glène
3. Management péri-op

Extension des indications

Limites...?

PTE inversée

- *progrès* -

1

**Progrès des techniques
opératoires**

PTE inversée

① - *techniques opératoires* -

Abord antéro-sup pré acromial

- accès peu invasif
- exposition de la glène
- ménagement du SSC
- rétention IS inf
- **nerf axillaire !**

PTE inversée

① - *techniques opératoires* -

Abord delto-pectoral

- accès peu invasif
- expo glène — bon
- accès post malaisé
- transferts LD / TM - reprise
- extension basse
- **nerf musculo-cut**

PTE inversée

① - *techniques opératoires* -

Correction des défauts passés des PTE inv
Meilleure mob (RI++) - complications

PTE inversée

① - *techniques op -*

Correction des défauts "passés"

Encoche pilier
scapula "notch"

PTE inversée

① - techniques op -

Correction des défauts “passés”

Glène vers le **bas** (“tilt <“)

Glène vers le **haut** (“tilt >“)

PTE inversée

- *progrès* -

2

**Progrès technologiques
industriels: implants**

PTE inversée

② - *implant huméral* -

design de la cupule
tiges courtes ou longues
tiges uniques anat - inv

Reprises de PTE

*Equinox
Preserve®*

*Equinox®
Exactech*

PTE inversée

② - *implant glénoïdien* -

Bases glénoïdiennes modulaires

vissages
multiples
verrouillés

→ Reprises de PTE

Equinox®
Exactech

compensations 20° sup ou post

plot central
allongé

standard

glénosphère latéralisée

PTE inversée

② - *implant glénoïdien* -

Vissages et positionnement glénosphère *assistés par ordinateur*

Principe

- scanner /3D
- position numérisée implants
- application moule de guidage

Intérêt

- morpho atypiques ++
- évaluation, pose occasionnelle

Mais défaut de

- feeling
- précision (*Lau & Heith JSES 2018*)

Exactech GPS Shoulder Application®

PTE inversée

② - *implant glénoïdien:
augmentation -*

Insuffisances osseuses glénoïdiennes

PTE inversée

② *implant glénoïdien: augmentation -*

Insuffisances glénoïdiennes

Comblement

Si perte > 50% os glène

- cales titanés
- allogreffes d'os de banque
- autogreffes de TH

Sans comblement

Si perte < 50% os glène

PTE inversée

② - greffe glénoïdienne -

Grefe de TH

PTE inversée

② - greffe glénoïdienne -

Insuffisance osseuse
glénoïdienne

Grefe de TH

PTE inversée

② - greffe glénoïdienne -

PTE inversée

- *progrès* -

3

Evolution du management
péri-opératoire

RST®

Rhena Shoulder Track

PTE inversée

③ - *Management péri-op: RST* -

- programme de **suivi péri-opératoire** rapproché du patient débutant avant l'OP et poursuivis jusqu'à la consolidation
- exécuté à la clinique par **l'équipe pluridisciplinaire**
- basé sur une **information** péri-opératoire accrue du patient et des consultations de groupes

Implication/responsabilisation accrue du patient

Immobilisation réduite

Rhéna Shoulder Track ®

PTE inversée

③ - *Management péri op: RST* -

- Personnalisation de la relation patient - kiné - chirurgien >< *dilution responsabilités en Centres RF*
- Meilleure compréhension / mobilisation précoce:
 - auto rééd , reprise gestes vie quot, immob réduite au maximum
- Accessibilité du chirurgien (*hotline mail*)

PTE inversée

③ - *Management péri op: RST -*

J1 post OP: 100° EAP

« la mobilisation précoce est un gain très net de J1 - J90 , ns ensuite »

(Denard & Lädermann

JSES déc 2016

étude niveau I

n=60)

PTE inversée

- *extension des indications* -

- **1.** Arthropathie par RC (TCA 1 et 2)
- **2.** Omarthrose excentrée (TCA ≥ 3)
- **3.** Omarthrose centrée complexe
- **4.** Reprises de PTE
- **5.** Fractures aiguës TH $\pm$ omarthrose
- **6.** Séquelles de fractures de TH
- **7.** Luxations invétérées

PTE inversée

- *indications* -

1. Arthropathie par RC (TCA 1 et 2)
2. Omarthrose par RC - excentrée (TCA ≥ 3)

Coiffes non fonctionnelles
avec perte EAA isolée

PTE inv

*Correction balance plan
sagittal*

Coiffes non fonctionnelles
avec perte EAA + RE

PTE inv + TLD

*Correction balance plans
sagittal et horizontal*

PTE inversée

- *indications* -

3. Omarthrose centrée I ou II

Coiffes douteuses
(IS *IDG* >2)

ou

Insuffisances glénoïdiennes
> 15°

PTE inv ± IS

PTE inv + augmentation

PTE inversée

- indications -

3. Omarthrose centrée I ou II

Insuff glén > 15° / sublux post TH

PTE inversée

- *indications* -

4. Reprises de PTE anat / inversées

Coiffes
douteuses
(IS *IDG* >2)

PTE inv ± IS

Insuffisances
glénoïdiennes

PTE inv +
augmentation

Insuffisances
humérales

PTE inv +
tiges longues

La PTE inversée n'est plus la dernière chance !

PTE inversée

- indications -

4. Reprises de PTE anat / inversées

Descellement
glène anat

Descellement
tige inversée

La capacité à reprendre les PTE permettent les primo implantations avec plus de sérénité et chez des patients plus jeunes

PTE inversée

- *indications* -

5. Fracture récente de la tête humérale

- **Ostéosynthèses** : pseudarthrose tubérosités et nécroses TH
- Mauvais résultat de la PTE pour séquelles de fractures après ostéosynthèses “ratées“
- Problèmes avec les **P Humérales simples**:
 - *Forte proportion de glénoïdites érosives*
 - *Reconstruction tubérosités ± réussie*

- le bon traitement tout de suite
- ne pas multiplier les interventions et allonger l'incapacité

PTE inversée

- *Indications* -

5. Fracture récente de la tête humérale

Fracture ES humérus à 3 ou 4 fragments: 15 à 40% nécroses

PTE inversée

- *Indications* -

5. Fracture récente de la tête humérale

Avant 60-65 ans: ostéosynthèses...

PTE inversée

- *Indications* -

5. Fracture récente de la tête humérale

Après 60-65 ans: prothèse humérale simple...(HA)

PTE inversée

- *Indications* -

5. Fracture récente de la tête humérale

Lader

Prothèse humérale simple...*glénoïdite érosive*
25% à 3 ans (*Mansat 2006*)

PTE inversée - *indications* -

5. Fracture récente de la tête humérale

PTE inv > P Hum (*Bonneviaille SOFCOT 2017*)

PTE inversée

- *Indications* -

6. Séquelles de fracture de la tête humérale

Ostéotomie des
tubérosités

PTE inversée

- indications -

6. Luxation invétérée de la tête humérale

91 ans
douleur
impot totale

glénosphère
sur vis
pilotis

PTE inversée

- indications -

6. Luxation invétérée de la tête humérale

TH luxée
antérieur
acétabulisation
fosse SSc

Pas de greffe glène
Montage sur pilotis

PTE inversée

- *conclusion* -

TTT médical

- Prioritaire
- Adapté: kiné performant
- Pathologies associées: *membre sup, cervical ++*
- Évalué +++ / durée limitée

TTT chir

- Echec du TTT médical
- Adapté: correspondre à la demande du patient
- “one shot“ (↗) infection si chir ant (*Cofield 2017*)
- **Restauration RE** si possible

PTE inversée

- *conclusion* -

Intérêt de la restauration de la **RE** (TLD) dépendant de l'âge ...

80 ans
Ø TLD

64 ans
TLD

PTE inversée - *limites* -

Humaines

- Demande “éternelle jeunesse”
- Patients de + en + jeunes
 - (Randall JSES 2017: 90% survie à 12 ans âge moyen 48a)
- Progrès des suites...
- Faux espoirs...
- Rachis bien plus sollicité ++

Risques d'escalade !

PTE inversée - *limites* -

Techniques

- Qualité oss. impossible à prévoir
- Valeur deltoïde ?
- Audace de l'opérateur...(TLD)
- Frilosité de l'opérateur (PTE anat)
- C'est une prothèse...(infection)
- **Reprises septiques** ...

Risques d'escalade !

PTE inversée

- *limites techniques* -

Reprises septiques

Tx PTE inv 2%

Risques sur-infections

PTE inversée

- *conclusion* -

PTE inversée

- *conclusion* -

PTE inversée

- conclusion -

“Il y a un temps pour tout mais on a pas le temps pour tout“

“Ne pas proposer un TTT qu'on n'accepterait pas pour soi-même“

RDV ultérieurs

L'arthroscopie du coude dans le TTT

- de l'épicondilite latérale
- de l'arthrose huméro-radio-ulnaire
- de la bursite olécrânienne

RDV ultérieurs

Démarrage étude multidisciplinaire prospective randomisée (niveau III) concernant le **TTT des épicondylites latérales**

- Physiothérapie
- Infiltration corticoïdes
- Infiltration PRP
- Ondes de choc EC
- Coblation sous arthroscopie

Positionnement de ces 5 TTT dans la chronologie de prise en charge